

D800

Čisticí směs na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody a zásobníky TUV.

Koncentrovaná čisticí směs D800 je určena k odstranění rzi a vodního kamene pro okruhy pitné vody a zásobníky TUV.

Vlastnosti

- odstraňuje rez a vápenaté usazeniny (vodní kámen)
- určena pro okruhy, rozvody a zásobníky pitné vody a TUV
- nepoškozuje sklo, plasty
- netoxické a biologicky rozložitelné
- je vhodná pro běžně používané typy kovů kromě hliníku
- prodlužuje účinnost a životnost systémů

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled	bezbarvá kapalina
Zápach	typický
pH	1
Hustota při 20 °C	1,17 g/cm ³
Rozpusťnost	ve vodě plně mísitelný



Dávkování a aplikace

Ředící poměry:	5% - minimální účinná koncentrace směsi
	5 až 10% - doporučená účinná koncentrace směsi

Systém napusťte vodou a nadávkujte čisticí směs D800 v minimálním množství 5% z celkového objemu vody v systému, tj. 5 l na 100 l (doporučená účinná dávka je 5 až 10%). Zajistěte neustálou cirkulaci po dobu 2 hodin. Po vyčištění systém řádně propláchněte a směs neutralizujte pomocí Q08neutralizatoru v nádobě mimo systém.

Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte.

Bezpečnostní opatření

Přípravek obsahuje nebezpečnou látku, kyselinu orthofosforečnou 75%.

H290	Může být korozivní pro kovy.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P260	Nevdechujte páry.
P280	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

- P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení,
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont.
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

- 1 l kanystr
- 20 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.